

با اسمه تعالی

مدت امتحان : ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸/۳۰ صبح	رشته: علوم ریاضی (۱)	سوالات امتحان نهایی درس: حساب دیفرانسیل و انتگرال (۱)
تاریخ امتحان: ۶ / ۱۲ / ۱۳۹۰	پیش دانشگاهی		
مرکز سنجش آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در جبرانی اول (اسفند ماه ۱۳۹۰)		
نمره	سوالات		ردیف

۱	ثابت کنید معکوس یک عدد منفی، عددی منفی است.		
۱	بازه $\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{3}\right)$ را به صورت یک همسایگی محذوف متقارن به مرکز $a$ و شعاع $\epsilon$ بنویسید.		
۲	ثابت کنید اگر دنباله $\{a_n\}$ همگرا باشد، آن گاه حد آن یکتا است.		
۱/۲۵	یکنواایی دنباله $\{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\}$ را بررسی کنید.		
۱/۵	نشان دهید سری $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$ همگرا است.		
+/۷۵	آیا سری $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{3k-1}{3k}$ همگراست؟ بوای پاسخ خود دلیل ارائه دهید.		
۱/۲۵	با استفاده از تعریف حد، ثابت کنید: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(-1)^{[x]} (x^2 - 1)}{x - 1} = 0$		
۱/۲۵	با استفاده از دنباله ها، ثابت کنید تابع $f(x) = \frac{ x }{x}$ در نقطه $x = 0$ حد ندارد.		
۲/۷۵	حدود توابع زیر را بدون استفاده از هم ارزی و قاعده هی هوپیتال محاسبه کنید. الف) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left[\frac{1}{x^2}\right]$ ب) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 2}$ ج) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{1+x} \times \arctan x$		
۱	نشان دهید حداقل یکی از ریشه های معادله $x^3 - 3x + 1 = 0$ در بازه $[1, 2]$ قرار دارد.		
۱/۲۵	معادله هی کلیه های مجانب های تابع $y = \frac{x^3 + 3}{x^2 - 2x}$ را بنویسید.		
۱	نقاط ناپیوستگی تابع $f(x) = \frac{3 - \sqrt{x+9}}{x+9}$ را در دامنه اش تعیین کنید.		
۱/۲۵	معادله هی خط مماس بر منحنی تابع $y = x^2 - 5x$ را در نقطه ای به طول ۲ واقع بر منحنی به دست آورید.		
۱/۵	اگر $f'(x) = \sqrt{3x + 16}$ باشد، مقدار عددی $(fog)'(1)$ را محاسبه کنید.		
۱/۲۵	ثابت کنید اگر تابع $g$ در نقطه $a$ مشتق پذیر باشد، آن گاه تابع $\frac{1}{g}$ نیز در نقطه $a$ مشتق پذیر است و $\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = \frac{-g'(a)}{g^2(a)}$		
۲۰	دانلود نمونه سوالات از سایت ریاضی سرا		WWW.RIVATISARA.IR

موفق باشید.

با سمه تعالی

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: علوم ریاضی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حساب دیفرانسیل و انتگرال (۱)
تاریخ امتحان: ۱۳۹۰/۱۲/۶		پیش دانشگاهی
مرکز سنجش آموزش و پژوهش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در جبرانی اول (اسفند ماه ۱۳۹۰)
نمره	راهنمای تصحیح	ردیف

۱	$a < 0 \xrightarrow[\text{(. / ۲۵)}]{\frac{1}{a^r} > 0} \frac{1}{a^r} \times a < \frac{1}{a^r} \times 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < 0 \quad (\cdot / ۲۵)$	۱
۲	$a = \frac{\frac{3}{2} + \frac{5}{2}}{2} = 2 \quad (\cdot / ۲۵), \quad \varepsilon = \frac{\frac{5}{2} - \frac{3}{2}}{2} = \frac{1}{2} \quad (\cdot / ۲۵) \Rightarrow \{x \in R \mid 0 <  x - 2  < \frac{1}{2}\} \quad (\cdot / ۵)$	۲
۳	<p>برهان خلف: فرض کنیم دنباله دارای دو حد متمایز مانند <math>l_1, l_2</math> باشد، داریم:</p> $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l_1 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists M_1 \in N \ni n \geq M_1 \Rightarrow  a_n - l_1  < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\cdot / ۲۵)$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l_2 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists M_2 \in N \ni n \geq M_2 \Rightarrow  a_n - l_2  < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\cdot / ۲۵)$ <p>فرض می کیم <math>M = \max\{M_1, M_2\}</math> داریم:</p> $0 \leq  l_1 - l_2  =  l_1 - a_n + a_n - l_2  \leq  a_n - l_1  +  a_n - l_2  < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad (\cdot / ۵) \Rightarrow 0 \leq  l_1 - l_2  < \varepsilon \Rightarrow l_1 = l_2 \quad (\cdot / ۲۵)$ <p>پس فرض خلف باطل و دنباله‌ی همگرا تنها یک حد دارد. <math>(\cdot / ۲۵)</math></p>	۳
۴	<p>روش اول:</p> $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \times \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \quad (\cdot / ۲۵) \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2} + 1}, \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{3}}, \dots \quad (\cdot / ۵)$ <p>دنباله نزولی است.</p> <p>روش دوم:</p> $a_n < a_{n+1} \Leftrightarrow \sqrt{n+1} - \sqrt{n} > \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} \Leftrightarrow 2\sqrt{n+1} > \sqrt{n+2} + \sqrt{n} \quad (\cdot / ۲۵)$ $\Leftrightarrow \sqrt{(n+1)^2} > \sqrt{n^2 + 2n + 1} + \sqrt{n^2 + 2n} \Leftrightarrow n+1 > \sqrt{n^2 + 2n} \Leftrightarrow n^2 + 2n + 1 > n^2 + 2n \Leftrightarrow 1 > 0 \quad (\cdot / ۲۵)$	۴
۵	$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + \underbrace{1 + \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \dots + \frac{1}{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n}}_{(\cdot / ۲۵)} < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \quad (\cdot / ۲۵)$ <p>عبارت <math>\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} &lt; 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 3</math> یک مجموع هندسی است. <math>(\cdot / ۲۵)</math> بنابراین <math>(\cdot / ۵)</math>. پس سری</p> <p>صعودی و کراندار است در نتیجه همگراست. <math>(\cdot / ۲۵)</math></p>	۵
۶	<p>خیر. و اگر است. <math>(\cdot / ۲۵)</math> . زیرا</p> $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{3k-1}{3k} = 1 \neq 0 \quad (\cdot / ۲۵)$	۶
۷	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \ni 0 <  x+1  < \delta \Rightarrow \left  \frac{(-1)^{[x]}(x^r - 1)}{x-1} - 0 \right  < \varepsilon \quad (\cdot / ۵)$ $\left  \frac{(-1)^{[x]}(x^r - 1)}{x-1} \right  = \underbrace{ (-1)^{[x]} }_{(\cdot / ۲۵)} \times \underbrace{\left  \frac{x^r - 1}{x-1} \right }_{(\cdot / ۲۵)} = \underbrace{1 \times  x+1 }_{(\cdot / ۲۵)} < \varepsilon \Rightarrow \delta \leq \varepsilon \quad (\cdot / ۲۵)$	۷

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: علوم ریاضی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس : حساب دیفرانسیل و انگرال (۱)
تاریخ امتحان: ۶ / ۱۲ / ۱۳۹۰	پیش دانشگاهی	
مرکز سنجش آموزش و پژوهش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در جبرانی اول (اسفند ماه ۱۳۹۰)	
نمره	راهنمای تصحیح	ردیف

۱/۲۵	<p>چون <math>f(x)</math> در صفر حد <math>\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n)</math> ، لذا <math>f(x)</math> پیوسته نیست.</p> $\begin{cases} a_n = \frac{1}{n} & (./25) \\ b_n = -\frac{1}{n} & (./25) \end{cases} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0 \quad (./25)$ $f(a_n) = 1, \quad f(b_n) = -1 \quad (./25)$ <p>ندارد . (./25)</p>	۸
۲/۷۵	<p>(الف) <math>\frac{1}{x^2} - 1 &lt; \left[ \frac{1}{x^2} \right] \leq \frac{1}{x^2} \quad (./25) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1 - x^2 &lt; x^2 \left[ \frac{1}{x^2} \right] \leq 1 \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - x^2) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1) = 1 \quad (./25)</math></p> <p>(ب) <math>\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x-2} \times \sqrt{x+2}}{\sqrt{x-2} \times \sqrt{x-2}} = \frac{2}{0^+} = +\infty \quad (./25)</math></p> <p>ج) <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{1+x} \times \operatorname{Arctan} x = \frac{\infty}{\infty} \times \frac{\pi}{\frac{\pi}{2}} = \pi \quad (./25)</math></p>	۹
۳	<p>تابع <math>f(x) = x^3 - 3x + 1</math> در بازه <math>[0, 1]</math> پیوسته است (<math>0/25</math>) و <math>f(0) \times f(1) = -1 &lt; 0</math> . طبق نتیجه قضیه مقدار میانی، معادله حداقل دارای یک ریشه است. (<math>0/25</math>)</p>	۱۰
۴/۲۵	<p>مجانب های قائم <math>x \rightarrow \infty \Rightarrow \begin{cases} x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty \end{cases} \Rightarrow x = \infty \quad (./25)</math> ، <math>\begin{cases} x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow \infty \end{cases} \Rightarrow x = 2 \quad (./25)</math></p> $x^2 + 2 = (x^2 - 2x)(x+2) + (4x+2) \Rightarrow (./25) \Rightarrow \text{مجانب مایل } y = x + 2 \quad (./25)$	۱۱
۵	<p>نقاط ناپیوستگی برابر است با <math>(-\infty, -9) \cup (-9, +\infty)</math> . (<math>0/25</math>)</p>	۱۲
۶/۲۵	<p><math>f(2) = -6 \quad (./25)</math> ، <math>y' = 2x - 5 \quad (./25) \Rightarrow m = -1 \quad (./25)</math></p> $y - (-6) = (-1)(x - 2) \quad (./25) \Rightarrow y = -x - 4 \quad (./25)$	۱۳
۷/۵	<p><math>g'(x) = 3x^2 \quad (./25) \Rightarrow g'(1) = 3 \quad (./25)</math></p> $(fog)'(1) = \underbrace{g'(1)}_{(./25)} \times \underbrace{f'(g(1))}_{(./25)} = 3 \times \underbrace{f'(0)}_{(./25)} = 3 \times \frac{4}{2} = 12 \quad (./25)$	۱۴
۸/۲۵	$\begin{aligned} \left(\frac{1}{g}\right)'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{g(a+h)} - \frac{1}{g(a)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a) - g(a+h)}{h(g(a+h)g(a))} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{g(a+h)g(a)} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} = \frac{-1}{g'(a)} \times g'(a) = \frac{-g'(a)}{g'(a)} \quad (./25) \end{aligned}$	۱۵
۹	همکاران گرامی، خدمت عرض خسته نباشید، به سایر راه حل های صحیح به تناسب نمره تعلق گیرد. با تشکر	